

اومنكس دي بي 98

الوظيفة

من المعروف ان عنصر الفوسفور مهم جدا للنباتات من اجل الحصول على محصول جيد . ولأن عوامل مثل رطوبة التربة ودرجة الـ **PH** نوعها تؤثر على كمية الفوسفور الميسر للامتصاص من التربة والمهم أثناء مراحل النمو الحرجة للنبات ، فالفوسفور المضاف للتربة مع السماد الارضي يعبر وحده غير كافي كمصدر للفوسفور المهم للنبات في مراحل نموه الحرجة

الوصف

الفوسفور في صورة **PO₃** هو مصدر قابل للذوبان في الماء بشكل كامل وخصوصا اذا تم تطبيقه عن طريق الرش الورقي مصادر الفوسفور التقليدية بالسوق يتنقل فيها الفوسفور داخل النبات من خلال الخشب ولكن الفوسفور في اومنكس دي بي يتم نقل بشكل فريد من خلال كل من الخشب واللحاء وبالتالي توفير عنصر الفوسفور بشكل اكبر لمنطقة الجذور وكذلك الى باقي اجزاء المحصول



تحليل اومنكس دي بي 98

وزن/حجم

0 %	N
28 %	P ₂ O ₅
12.6 %	K ₂ O

النيتروجين

الفوسفور

البوتاسيوم

5.0-6.0

PH (محلول 10%)

1.35

الكثافة النسبية

طريقة الاستخدام

يجب ملئ تانك الرش بالماء الى نصف الكمية المطلوبة للرش ثم معايرة الكمية المستخدمة من اومنكس دي بي ثم تضاف الى التانك مع التقليب الجيد ثم بعدها تضاف كمية المياه المتبقية الى التانك وتتم عملية الرش



التخفييف

كمية المياه الموصي بها للهكتار هي
1500 لتر ماء : 500
دائماً تأكّد من رج العبوة قبل الاستخدام

نتائج استخدام اومكس دي بي 98

زيادة الانتاجية
تحسين جودة المحصول وطول فترة صلاحية الثمار
دعم الامتصاص الورقي للكاتيونات مثل
البوتاسيوم-الكالسيوم-الماغنيسيوم-المجنيز

تحسين صحة النبات ومقاومته للأمراض
تحسين عمل المجموع الجذري
زيادة نسبة العقد والاثمار
ارتفاع نسبة المواد الصلبة

توصيات الاستخدام

المحصول	لتر / هكتار	ملي / 100 لتر	التطبيق
الفاح	4	800	الرش عند تساقط البلاطات ويكرر كل 7 أيام
الكرنب	2	400	الرش عند 2 - 4 أوراق ويكرر حسب الحاجة
الجزر	2	400	الرش عند 3 - 4 أوراق ويكرر حسب الحاجة
المواحل	4	400	الرش عند بداية النمو الجديد ويكرر كل 10-14 أيام
	0.4	400	في الربيع يستخدم كسقية للجذور
الخس	4	800	رشتين ، الاولى بعد 7 - 10 أيام من الزراعة
	4	800	الرشة الثانية بعد الاولى بـ 10 - 14 يوم
البصل والكرات	2	400	الرش عند 3 - 4 أوراق ويكرر حسب الحاجة
نباتات الزينة	4	200 : 400	الرش عند بداية النمو ويكرر كل 10 - 14 يوم
اناناس	3 : 4	400	رش ورقي كل 14 يوم
	0.3	400	سقية تصواني للزراعة
البطاطس	2	400	الرش عند بداية نمو الدرنات ويكرر كل 14 يوم
التوت الاحمر	4	800	الرش عند بداية البرعم الاخضر ويكرر حسب الحاجة
الفراولة	4	800	الرش عند بداية البرعم الاخضر ويكرر كل 21 يوم

احتياطات الخلط

اومكس دي بي 98 ملائم للخلط مع معظم المبيدات ومنظمات النمو والعناصر المغذية الصغرى ولكن ليس كلها مناسبة للخلط معه ، مع الاخذ في الاعتبار التفاعلات الناتجة عن الخلط والتاثير على النبات ولذلك يجب اجراء تجربة خلط مصغرة قبل التعميم والشركة لا تتحمل اي مسؤولية عن سوء الاستخدام بما في ذلك الحرارة وحالة النبات المعامل ومرحلة النمو وكمية المياه المستخدمة

احتياطات الامان

يجب تخزين اومكس دي بي 98 بعيداً عن التجميد تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين 5-40°C وهو مادة غير خطيرة وغير قابلة للاشتعال يجب ارتداء القفازات وواعي الوجه عند التعامل مع الماده في حالة التخزين لفترة طويلة قد يحدث ترسيب خفيف للمادة ولذلك يجب الرج قبل الاستخدام

العبوات

اومنكس دي بي 98 متاح في عبوات سعة
لتر و 5 لتر