قائمة بأصناف البذور ومواعيد زراعتها اعداد/ م. حسن مكي

			# F - 12			
م	الصنف	الشركة المُنتِجة	الوصف	التوصيات حسب الشركة المُنتِجة	ملاحظات علي الصنف	المناطق الملائم لها
1 خيار	خيار إمباير	نیکرسون زوان	خيار أنثوي شتوي	يزرع بالعروة الشتوية المبكرة خلال أكتوبر	مواصفات ممتازة للثمرة، 2-3 ثمار علي العقدة، أفرع جانبية غير مستمرة	معظم المناطق
ء خياه	خيار مونديال		خيار أنثوي ربيعي	يزرع بالعروة الربيعية المبكرة خلال فبراير	انتاج مكثف	المنطقة الشمالية والغربية
3 خيار	خيار واجد		خيار أنثوي ربيعي- خريفي	يزرع بالعروتين الربيعية المتأخرة والخريفية خلال مارس - ابريل بالبيوت العادية، مايو بالبيوت المبردة، ثم خلال سبتمبر	انتاج يستمر لمدة أطول	معظم المناطق
ک خیار	خيار جول		خيار أنثوي ربيعي- خريفي	يزرع بالعروتين الربيعية المتأخرة والخريفية من مارس - منتصف مايو بالبيوت العادية، من منتصف أغسطس - نهاية سبتمبر	انتاج يستمر لمدة أطول	معظم المناطق
عيار	خيار إنجي	انزا زادن	خيار أنثوي ربيعي- خريفي مبكر	يزرع بالعروتين الربيعية المتأخرة والخريفية المبكرة خلال مارس - ابريل بالبيوت العادية، مايو بالبيوت المبردة، ثم من منتصف أغسطس حتي منتصف سبتمبر	انتاج مكثف، متعدد الازهار علي العقدة،	معظم المناطق
) خيار	خيار أمبل		خيار أنثوي صيفي	يزرع بالعروة الصيفية من منتصف ابريل وحتي منتصف أغسطس يزرع مقابل خيار ألفريد - يعتبر من أقوي 6 أصناف بسوق لشرق الأوسط للبذور من حيث التحمل للفيروسات - ذو قدرة عالية للإنتاج - يراعي زيادة مياه الري والكالسيوم نسبياً عن الأصناف الأخرى	تحمل جيد للحرارة، تحمل جيد للفيروسات، انتاج غزير، - يراعي زيادة مياه الري والكالسيوم نسبياً عن الأصناف الأخرى	معظم المناطق
7 كوس	كوسة دريم	نیکرسون زوان	شتوية	تحمل للبرودة، انتاج جيد، ثمرة ذات مواصفات جيدة	ذات انتفاخ متوسط	الرياض، الاحساء، المنطقة الغربية، نجران، القصيم
3 ک وس	كوسة نور	انزا زادن	صيفية	تحمل جيد للفيروسات، نوعية كوين، زهرة قوية الالتحام بالثمرة	انتاج مرتفع، ثمرة مستطيلة، أفضل لون ثمرة صيفاً حيث لا يتحول للاخضر الفاتح	القصيم، نجران، الرياض، المنطقة الغربية، الدمام الاحساء
و کوس	كوسة سمر ليدي		ربيعية - صيفية	تحمل جيد للفيروسات، تحمل جيد للبياض الدقيقي، نوعية أنيتا، زهرة ملتحمة بصورة جيدة خاصة في حالة الثمار صغيرة الحجم، وكلما كَبُر حجم الثمار يقل التحام الزهرة نسبياً.	انتاج مرتفع، ثمرة ذات انتفاخ من الطرف، لون جيد صيفاً	القصيم، الدمام، الرياض، المنطقة الغربية، ساجر، الاحساء
1(طما	طماطم ريتاج	انزا زادن	شتوية	محصول وفير، 6-8 ثمار/ العنقود، حجم الثمار 180-190جرام ذات لون أحمر جيد، ذات صلابة جيدة. تزرع بشهر أكتوبر حتى منتصف يناير.	نبات ذو دورة طويلة	معظم المناطق
11 طما	طماطم بلقيس	نيكرسون زوان	شتوية	تحمل عالي لفيروس اصفرار والتفاف الأوراق، 5-6 ثمار /عنقود، حجم الثمار 190- 200جرام ذات لون أحمر جذاب، ذات صلابة عالية، تزرع بداية من سبتمبر وحتي فبراير.	نبات ذو دورة طويلة	معظم المناطق

المناطق الملائم لها	ملاحظات علي الصنف	التوصيات حسب الشركة المُنتِجة	الوصف	الشركة المُنتِجة	الصنف	م
معظم المناطق	يصلح للزراعة الخارجية و داخل البيوت	نوعية لامويو، ثمار كبيرة الحجم، 19× 11سم، سميك الجدار، عقد جيد تحت مختلف الظروف، تحمل لفيروس الذبول المنقط TSWV، محصول عالي.	ربيعي - خريفي	انزا زادن	فلفل ماكاو	12
معظم المناطق	يصلح للزراعة الخارجية و داخل البيوت	محصول وفير، ثمار ذات لون أسود لامع ذات كأس أخضر بدون أشواك، عقد جيد بمختلف الظروف،	ربيعي - خريفي	انزا زادن	باذنجان بلاك بيرل	13
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	تبكير، لون القرص أبيض ناصع، تغطية ذاتية للرأس، رأس مندمجة، تحمل عالي للحرارة	صيفية	نیکرسون زوان	زهرة ميلكوا <i>ي</i>	14
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	تبكير جيد، رأس كروية مندمجة ذات لون أبيض، تحمل جيد للتشقق وللحرارة و التزهير،	صيفي	نیکرسون زوان	ملفوف فيموس	15
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	رأس كروي مندمج ذات لون أحمر داكن، نبات متوسط الحجم، تحمل عالي للتشقق والتزهير	شتوي	نیکرسون زوان	ملفوف رید ستار	16
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	رأس مفلطح مندمج ذات لون أخضر مزرق، يناسب التصنيع والاستهلاك الطازج، متوسط التبكير	ربيعي - خريفي	نیکرسون زوان	بروكلي جرين ستار	17
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	تبكير عالي، مواصفات ممتازة للثمار ذات لون أحمر جذاب وذات صلابة جيدة، تحمل جيد لفيروس اصفرار والتفاف الأوراق،	ربيعية - خريفية	نیکرسون زوان	طماطم ريماس	18
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	نوعية أناناس، متوسط التبكير، تحمل للشحن والتداول، ثمار ذات شبكية كثيفة ذات لب برتقالي اللون تحتوي نسبة مرتفعة من السكر 11 بركس، بوزن 2.5- 3 كجرام	ربيعي - خريفي	نیکرسون زوان	شمام ایدیال	19
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	نوعية هاني ديو، متوسط التبكير، ثمار كروية الشكل ذات لون برتقالي تمتاز بارتفاع نسبة السكر 13-14 بركس.	ربيعي - خريفي	- نون يو	شمام رید کوین	20
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	متوسط التبكير، نوعية كايين، ثمار طويلة 15 سم سميكة ذات لون أخضر داكن،	ربيعي - خريفي		فلفل حار باشن	21
معظم المناطق	للزراعة المكشوفة	انتاج وفير، ثمار نحيفة وطويلة خالية من الأشواك ذات لون أخضر فاتح	ربيعية		بامية سوث سي	22
المناطق ذات الحرارة والرطوبة المرتفعة، والغير معرضة للصقيع	للزراعة المكشوفة	النباتات متقزمة 2.5- 3 متر، ثمار تزن من 1.5- 2 كجرام، خضراء اللون تتحول بعد النضج للون أصفر - برتقالي، ذات لب برتقالي مرتفعة المحتوي من السكر 13-15 بركس، البذور تزرع في سبتمبر والشتلات تحتاج لـ 2.5 - 3 أشهر بالمشتل لتصبح جاهزة للزراعة، وتحتاج لفترة 5- 6 أشهر لبداية الإنتاج، ومن ثم يستمر الانتاج متصلاً لعمر عامين من الزراعة.	ربيعية		بابايا ريد ليد <i>ي</i>	